

Ga als volgt te werk wanneer u een ernstige allergische reactie krijgt:

- Stop met het injecteren van pegvaliase
- Gebruik adrenaline indien nodig (voordat u begint met het gebruik van pegvaliase, schrijft uw arts u een injectiehulpmiddel met adrenaline voor en leren u en uw waarnemer wanneer en hoe de adrenaline moet worden gebruikt). Draag het injectiehulpmiddel met adrenaline altijd bij u
- Bel 112 of ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp

VOOR ZORGVERLENERS

Voor deze patiënt is pegvaliase voorgeschreven. Het gebruik van dit product is in verband gebracht met ernstige allergische reacties.

Raadpleeg de Samenvatting van de productkenmerken voor meer informatie over pegvaliase.

Vermoedelijke bijwerkingen moeten worden gemeld bij **drugsafety@bmrn.com** of via het nationale meldsysteem.

© 2025 BioMarin International Ltd. Alle rechten voorbehouden.
EUCAN-PAL-00306 May 2025

Pegvaliase

WAARSCHUWINGSKAART VOOR PATIËNTEN

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn. Vermoedelijke bijwerkingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot overgevoeligheid) kunnen ook gemeld worden bij drugsafety@bmrn.com of fax: +1-415-532-3144 of tel.: +1-415-506-6179.

Vermeld het batch-/lotnummer van uw geneesmiddel in het rapport.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of ga naar www.palynziq.com/rmm-nl/ voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Naam patiënt: _____

Leeftijd: _____

Informatie over allergie: _____

Andere gezondheidsproblemen (zoals astma): _____

Contactgegevens voor noodgevallen:

Naam contactpersoon voor noodgevallen: _____

Contactgegevens voor noodgevallen: _____

Naam arts: _____

Contactgegevens arts: _____

Contactgegevens arts buiten werktijden: _____

Pegvaliase kan ernstige allergische reacties veroorzaken die levensbedreigend kunnen zijn. Ze kunnen op ieder moment optreden na een injectie met pegvaliase. **Stop met het injecteren van pegvaliase als een van de volgende symptomen optreedt.**

BELANGRIJK: zorg dat u altijd een injectiehulpmiddel met adrenaline en deze kaart bij u hebt. Laat deze kaart in een noodgeval zien aan het medisch personeel.

Mogelijke symptomen van een ernstige allergische reactie zijn:

- Opgezwollen gezicht, ogen, lippen, mond, keel, tong, handen en/of voeten
- Ademhalingsproblemen of piepende ademhaling
- Opgezette keel of verstikkend gevoel
- Moeite met slikken of spreken
- Duizeligheid of flauwvallen
- Minder controle over urine of stoelgang
- Snelle hartslag
- Netelroos (jeukende huiduitslag met bultjes) die zich snel verspreidt
- Blozen
- Hevige buikkrampen of -pijn, braken of diarree